

ACIP專家會議COVID-19疫苗接種建議

1/3

6個月至5歲幼兒莫德納 COVID-19 疫苗接種建議

- 目前國內處於社區流行階段，建議6個月至5歲幼童接種莫德納 COVID-19 疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡之風險
- 經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4-8週以上。

5-11歲兒童COVID-19疫苗基礎加強劑及追加劑接種建議

- 對於免疫不全及免疫力低下且病情穩定者建議接種基礎加強劑(與第二劑間隔28天後接種)
- 對於完整接種基礎劑對象，建議於滿5個月(150天)後，接種追加劑。

2022/06/27

中央流行疫情指揮中心

ACIP專家會議COVID-19疫苗接種建議

2/3

機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員第二次追加劑接種建議

- 建議機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員接種第2次追加劑
- 建議2劑間隔5個月以上

Novavax COVID-19 疫苗接種建議

- 建議使用於18歲以上民衆接種基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑
- 可與其他廠牌交替使用

2022/06/27

中央流行疫情指揮中心

ACIP專家會議COVID-19疫苗接種建議

3/3

COVID-19確診者疫苗接種建議

- 無論先前是否具 SARS-CoV-2 感染史，建議應依各廠牌應接種劑次，完成 COVID-19 疫苗基礎劑及追加劑接種
- 依據現有有限資料顯示，延長SARS-CoV-2感染後接種COVID-19疫苗之間隔，可增加接種疫苗後誘發之免疫保護力，且感染後短期間重複感染機率較低，爰建議確診者可自發病日或確診日(無症狀感染者)起3個月且無急性症狀後，接種 COVID-19 疫苗
- 確診者若已無急性症狀且符合解隔條件，如符合下列情形，可經醫師評估適宜接種後，完成尚未完成之COVID-19疫苗劑次：
 - ◆ 因工作需求、工作性質等原因導致感染風險可能增加
 - ◆ 免疫力/免疫功能低下導致感染風險增加
 - ◆ 因應入境其他國家時疫苗接種紀錄查核之需

2022/06/27

中央流行疫情指揮中心

7/1起免費提供

第2輪0-6歲5劑家用抗原快篩試劑

| 領取時間 7/1起

| 領取對象 2015/9/2(含)以後出生者為限

針對政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取

| 領取地點

全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所

攜帶0-6歲幼兒的健保卡至實名制銷售藥局/衛生所領取免費家用抗原快篩試劑1份(5劑)

| 家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童

2022/06/27

中央流行疫情指揮中心

猴痘是什麼？

- ★人畜共通病毒感染，潛伏期約為5-21天，通常為6-13天
- ★症狀包括發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠、皮疹
- ★發燒1至3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見。皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿庖階段變化，最終結痂脫落。症狀可能持續14至21天

主要傳播方式

- ★直接接觸感染猴痘的動物
- ★直接接觸到病患的呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜、被污染的物品
- ★飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生

2022/06/27

疾病管制署

猴痘的預防及照護

疫苗與治療照護

- ★不建議大規模接種猴痘疫苗，國際間通常建議高暴露風險職業或高感染風險之密切接觸者可接種疫苗
- ★大多數病患的不需特殊治療，必要時，可提供輸液治療與維持營養等支持性療法，以減輕症狀和併發症
- ★目前有數種藥物可用於治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者使用

預防方法

- ★前往猴痘病毒動物流行地區時，避免接觸齧齒動物和靈長類動物及生病或死亡動物，所有食物必須澈底煮熟後才能食用
- ★避免與猴痘病患接觸，或接觸時應佩戴適當防護裝備
- ★如有任何疑似症狀，應及時就醫，並告知旅遊史與接觸史

2022/06/27

疾病管制署